

# KATALOG PRODUKTÓW 2025

ROŚNIJMY RAZEM



# Wymieniaj punkty na nagrody!

Kupujesz produkty Cortevea?  
Dołącz do programu lojalnościowego  
i wygodnie wymieniaj punkty na nagrody!

## SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ:



Nagroda za każdy  
zakup



Ekstra punkty  
i akcje specjalne



Wymarzone  
wakacje



Prognoza  
pogody



Szkolenia  
i webinary

## ...i wiele więcej!

Nie czekaj, zarejestruj się w programie e-pole już dziś!



## Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą środków ochrony roślin i produktów biologicznych Corteva.

Jesteśmy dumni z faktu, że od kilku lat dostarczamy Państwu nowe rozwiązania, które w czasach wycofywania kolejnych substancji czynnych pozwalają na skuteczną i opłacalną ochronę upraw rolniczych. Już od ponad 7 lat dostarczamy polskiemu rolnikowi herbicydy bazujące na Arylex™ active, które z sukcesem stosowane są w uprawach zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego. Plantatorzy ziemniaka chwalą sobie kolejne fungicydy zawierające Zorvec™ active, substancję o najwyższej ocenie ochrony przed zarazą ziemniaka (zarówno zarazy liści, jak i zarazy bulw). Jesteśmy też dumni z fungicydów z Inatrea™ active, substancją czynną, która po raz pierwszy od 20 lat dostarcza praktycznie nowy mechanizm działania w ochronie fungicydowej zbóż. Intensywnie rozwijamy kolejne molekuly, które w dzisiejszych czasach, poza wysoką skutecznością, muszą spełniać również wiele restrykcji środowiskowych.

Stale rozwijamy też ofertę w zakresie zapraw nasiennych oraz inwestujemy w sektor produktów biologicznych. Rozumiemy problemy rolników. Zapewniamy fachowe doradztwo na każdym etapie sezonu wegetacyjnego. Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb rolników, wielkości ich gospodarstwa i jego specyfiki. Wszystko po to, aby pomóc Państwu uzyskać wysoki plon oraz zwiększyć efektywność ekonomiczną gospodarstwa.

Życzymy udanego sezonu!

Zespół Corteva Agriscience

## Spis treści

|    |                        |
|----|------------------------|
| 11 | <b>FUNGICYDY</b>       |
| 12 | Alert™ Pak             |
| 13 | Capetus Extra® 250 EC  |
| 14 | Colverado® 240 EC      |
| 15 | Fontelis™ 200 SC       |
| 16 | Philon® 250 SC         |
| 17 | Qash™ Tesanto® Pak     |
| 18 | Queen™                 |
| 19 | Talius™ 200 EC         |
| 20 | Talius™ Sad            |
| 21 | Wirtuoz Pro™           |
| 22 | Zorvec™ Entecta™       |
| 23 | <b>HERBICYDY</b>       |
| 24 | Belkar™ Kliper™ Pak    |
| 25 | Bizon™                 |
| 26 | Dragster™ Pak          |
| 27 | Elipris™               |
| 28 | Fernando Forte™ 300 EC |
| 29 | Kerb™ 400 SC           |
| 30 | Korvetto™              |
| 31 | LaDiva™                |
| 32 | Lancet Plus™ 125 WG    |
| 33 | Lontrel™ 300 SL        |
| 34 | Mustang™ 306 SE        |
| 35 | Mustang Forte™ 195 SE  |
| 36 | Navigator™ 360 SL      |
| 37 | Nomad™ 75 WG           |
| 38 | Principal™ Flex        |
| 39 | Promungu® 700 SC       |
| 40 | Quelex™ Complex Pak    |
| 41 | Rexade™ Esteron™ Pak   |
| 42 | Starane™ Forte         |
| 43 | Starane™ Trawniki      |
| 44 | Titus™ 25 WG           |
| 45 | <b>INSEKTYCYDY</b>     |
| 46 | Spintor™               |
| 49 | <b>BIOSTYMULATORY</b>  |
| 50 | BioForge®              |
| 51 | BlueN®                 |
| 52 | Cellerate MoZn         |
| 53 | Instinct™              |
| 54 | Kinsidro™ Grow         |
| 55 | Resid® MG              |
| 56 | StarterMn Platinum     |
| 57 | Utrisha™ N             |
| 59 | <b>Kontakt</b>         |

Treści przedstawione w katalogu nie są etykietą-instrukcją stosowania prezentowanych środków ochrony roślin. Pamiętaj, że zgodnie z prawem masz obowiązek, zaznajomić się przed zastosowaniem preparatu, z etykietą-instrukcją stosowania, którą znajdziesz m.in. na opakowaniu preparatu.

# Fungicydowa ochrona pszenicy ozimej oraz stosowanie produktów biologicznych Corteva

JESIEŃ

WIOSNA

 - fungicyd  
 - produkt biologiczny

**Wirtuoz PRO™**  
BBCH: 25-65

**Queen™**  
Inatreq™ active  
BBCH: 30-69

**Talius™**  
200 EC  
BBCH: 27-59

**Alert™ Pak**  
BBCH: 31-59

**Capetus Extra® 250 EC**  
BBCH: 30-59

**Philon® 250 SC**  
BBCH: 30-59

**Qash™ Tesanto® Pak**  
BBCH: 37-69

**BlueN® / Utrisha™ N**  
BBCH: 25-61

**Kinsidro™ Grow**  
BBCH: 25

**Kinsidro™ Grow**  
BBCH: 12-13

| skala BBCH     | 00 | 11             | 12             | 13             | 21                  | 25                | 29                | 31              | 32              | 45                                 | 51                 | 59               | 69                |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| suchy ziarniak |    | faza 1. liścia | faza 2. liścia | faza 3. liścia | początek krzewienia | pełnia krzewienia | koniec krzewienia | faza 1. kolanka | faza 2. kolanka | nabrzmiąta pochwa liścia flagowego | początek kłoszenia | koniec kłoszenia | koniec kwitnienia |




# Herbicydowa ochrona pszenicy ozimej produktami Corteva



Nomad™, Rexade™ Esteron™ Pak, Lancet™ Plus – nie stosować w jęczmieniu. Starane™ Forte – nie stosować w owsie.  
 Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

# Fungicydowa i herbicydowa ochrona rzepaku oraz stosowanie produktów Corteva



# Herbicydowa ochrona kukurydzy oraz stosowanie produktów biologicznych Corteva

## Mustang™

306 SE

BBCH: 12-16



– herbicyd

## Dragster™ Pak + Dassoil™

BBCH: 12-16



– produkt biologiczny

## Principal™ Flex + Dassoil™

BBCH: 12-16

## Titus™ + Vivolt

25 WG

BBCH: 11-17




## Kinsidro™ Grow

BBCH: 12-16




## BlueN® / Utrisha™ N

BBCH: 14-18



skala  
BBCH

# Program ochrony ziemniaka produktami Corteva





# Fungicydowa ochrona jabłoni produktami Corteva

- fungicyd

**Fontelis™**  
200 SC

BBCH: 10-81

parcz jabłoni, mączniak jabłoni

**Fontelis™**  
200 SC

BBCH: 65-67

szara pleśń

**Fontelis™**  
200 SC

BBCH: 81

szara pleśń

**Talius™ Sad**

BBCH: 10-75

**Talius™ Sad**

BBCH: 85



skala  
BBCH

00 06 07 09 10 15 19 55 57 59 65 67-68 71-72 75 79 81 87



**Zawiera Inatreq™ active  
– pierwszą od lat substancję  
z nowej grupy chemicznej**

Unikalny mechanizm wydłuża ochronę  
do 6 tygodni

Fungicydy zawierające Inatreq™ active  
wykazują wyjątkową skuteczność  
w ochronie przed septoriozą paskowaną liści  
(nawet odporną) wg badań AHDB

Przełomowa formuła iQ-4™  
zapewnia niemal 100% pokrycia liści

Wyjątkowa ochrona w terminie T2  
dająca efekt złotego ziarna

**Queen™**

Inatreq™ active

**FUNGICYD**

**Królewska jakość  
ochrony zbóż**

**e-pole™**  
PROGRAM PARTNERSKI

 **CORTEVA™**  
agriscience

Więcej na **corteva.pl**

®.™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.  
©2024 Corteva.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

# Fungicydy

Skuteczna ochrona przed najgroźniejszymi patogenami chorobotwórczymi:

- w uprawach zbóż (fungicydy z Inatreq™ active – Queen™ i Qash™ Tesanto® Pak oraz Alert™ Pak, Capetus Extra® 250 EC, Philon® 250 SC, Talius™ 200 EC, Wirtuoz PRO™),
- w uprawach ziemniaków (Zorvec™ Entecta™),
- w sadach (Fontelis™ 200 SC, Talius™ Sad),
- w uprawach rzepaku (Colverado® 240 EC, Philon® 250 SC).





## FUNGICYD

Pakiet fungicydów:

Philon™ 250 SC i Capetus Extra™ 250 EC

**zawiera:**

- azoksystrobina 250 g/l; wg FRAC grupa 11
- protriakonazol 125g/l; wg FRAC grupa 3
- tebukonazol 125 g/l; wg FRAC grupa 3

Dostępne opakowania:  
pakiet na 4 ha



działa układowo (systemicznie)



działa wgłębnie (translaminarnie)

### Stosowanie środka:



| pszenica<br>ozima i jara                                                                                                                                                 | żyto<br>ozime                                                                                   | pszenżyto<br>ozime                                                                                                                                    | pszenżyto<br>jare                                                                                                                              | jęczmień<br>ozimy i jary                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mączniak prawdziwy<br>zbóż i traw, brunatna<br>plamistość liści, rdza<br>brunatna pszenicy, sep-<br>torioza liści, septorioza<br>plew, fuzarioza kłosów,<br>czerń kłosów | rdza brunatna,<br>fuzarioza kłosów,<br>brunatna plami-<br>stość liści, ryncho-<br>sporioza zbóż | rdza brunatna,<br>brunatna plami-<br>stość liści, septorio-<br>za plew, septorioza<br>paskowana liści,<br>rynchosporioza<br>zbóż, fuzarioza<br>kłosów | mączniak prawdzi-<br>wy zbóż i traw, rdza<br>brunatna, septorio-<br>za paskowana liści,<br>brunatna plami-<br>stość liści, fuzarioza<br>kłosów | mączniak prawdziwy<br>zbóż i traw, rdza jęcz-<br>mienia, rynchospo-<br>rioza zbóż, plamistość<br>siatkowa jęczmienia,<br>fuzarioza kłosów,<br>czerń zbóż (jęczmień<br>jary) |



stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia



**MAX**

**maksymalna dawka:**

pakiet handlowy 3 x 1 | Capetus Extra™ 250 EC oraz 2 x 1 | Philon™ 250 SC na 4 ha



**zalecana dawka:** Philon™ 250 SC 0,8–1 l/ha, Capetus Extra™ 250 EC 0,75–1,0 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200–300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



Więcej informacji

# Capetus Extra<sup>®</sup>

## 250 EC



### FUNGICYD

#### zawiera:

- protiokonazol 125g/l; wg FRAC grupa 3
- tebukonazol 125 g/l; wg FRAC grupa 3

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l



działa układowo

#### Stosowanie środka:



| pszenica<br>ozima                                                                                                                                                     | pszenica<br>jara                                                                                                                                          | pszenżyto<br>ozime                                                                                                           | pszenżyto<br>jare                                                                                                      | jęczmień<br>ozimy                                                                                                 | jęczmień<br>jary                                                                                                                   | żyto<br>ozime                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż | mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów | rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów | mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów | mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów | mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż | rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż |



stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)



**MAX** maksymalna dawka: 1,0 l/ha



**zalecana dawka:** 0,75–1,0 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200–400 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



**okres karencji:** 56 dni



Więcej informacji

# Colverado<sup>®</sup>

## 240 EC



RZEPAK

### FUNGICYD

#### zawiera:

- protiokonazol 80 g/l; wg FRAC grupa 3
- tebukonazol 160 g/l; wg FRAC grupa 3



działa układowo

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

#### Stosowanie środka:

|  | rzepak ozimy                                                                                                                                                                                       | rzepak jary                                                                                                                                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych (w dawce 0,75 l/ha)                                                                                                                                   | sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń                                                                                                                                                   |
|  | stosować jesienią – w fazie 4–8 liści rzepaku (BBCH 14–18)<br>stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi | stosować od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30–57)<br>stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem |

**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 0,75–1 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200–400 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:**

- rzepak ozimy: 2 (1 zabieg jesienią, 1 zabieg wiosną)
- rzepak jary: 1



**okres karencji:** 56 dni



Więcej informacji



# Fontelis™ 200 SC




JABŁOŃ

## FUNGICYD

### zawiera:

- pentiopirad 200 g/l; wg FRAC grupa 7



działa kontaktowo



działa wgłębnie



działa lokalnie układowo

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

### Stosowanie środka:

#### jabłoń



parch jabłoni, mączniak jabłoni

szara pleśń



stosować od fazy rozwojowej BBCH 10 (wierzchołki liści wystają 10 mm powyżej łuski pąków) do 21 dni przed zbiorem owoców

stosować:

- od fazy pełni kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych) do fazy zasychania kwiatów, większość płatków opada (BBCH 65–67), zwłaszcza podczas deszczowej pogody,
- przed zbiorem na początku dojrzewania owoców (BBCH 81), ale nie później niż 21 dni przed ich zbiorem



**MAX** maksymalna dawka: 0,75 l/ha



**zalecana dawka:** 0,5–0,75 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 500–750 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 3 (odstęp między zabiegami – co najmniej 7 dni)



**okres karencji:** 21 dni



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania

# Philon<sup>®</sup> 250 SC



## FUNGICYD

### zawiera:

- azoksystrobina 250 g/l; wg FRAC grupa 11



działa układowo (systemicznie)

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

### Stosowanie środka:

|  | pszenica ozima,<br>pszenica jara                                                                                                                         | żyto                                | rzepak ozimy                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów     | rdza brunatna, ryńcho-sporioza zbóż | czerń krzyżowych, szara pleśń                                                                                                                                                     | zgnilizna twardzikowa w zalecanej dawce 1 l/ha                                                                                                |
|  | stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia |                                     | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń rzepaku | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku kwitnienia rzepaku do fazy końca kwitnienia |

**MAX** maksymalna dawka: 1,0 l/ha

**zalecana dawka:** 0,5–1,0 l/ha

**ilość wody do zabiegu:** 200–300 l/ha

**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste

**liczba zabiegów w sezonie:** 1

**okres karencji:** 35 dni (zboża, rzepak)

Środek jest także zarejestrowany do zwalczania chorób w uprawie cebuli, fasoli szparagowej, grochu uprawianego na zielone nasiona, kapusty głowiastej i pekińskiej do długotrwałego przechowywania, marchwi, pomidora w uprawie polowej, pora, selera, papryki w uprawie tunelowej

Więcej informacji



# Qash™ Tesanto® Pak

Inatreq™ active



## FUNGICYD

Pakiet fungicydów: Qash™ i Tesanto®

Qash™:

- Inatreq™ active (fenpikoksamid, związek z grupy pikolinamidów)  
– 50 g/l; wg FRAC grupa 21

Tesanto®:

- benzowindyflupyr 100 g/l; wg FRAC grupa 7

Dostępne opakowania: 5 l, pakiet na 10 ha



działa układowo



działa wgłębnie (translaminarnie)

### Stosowanie środka:



| pszenica ozima                                                                                                                                       | pszenica jara                                                                                        | pszenżyto ozime                          | żyto ozime                               | pszenica twarda, pszenica orkisz*                                                   | pszenżyto jare*        | żyto jare*                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew                                                        | rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw | septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw | rynychosporioza zbóż, rdza brunatna żyta | septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy | rdza żółta zbóż i traw | rynychosporioza zbóż, rdza brunatna żyta |
| stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69) |                                                                                                      |                                          |                                          |                                                                                     |                        |                                          |



**maksymalna/zalecana dawka:** Tesanto® 0,5 l/ha, Qash™ 1,0–1,5 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 150–300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji możliwe jest sadzenie lub sianie roślin następczych (z wyjątkiem nasion roślin strączkowych oraz nasion i owoców oleistych) po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu środkiem.



#### okres karencji:

- 42 dni (zabieg w fazie BBCH 61–69);
- nie dotyczy (zabieg w fazie do BBCH 61)

\* Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Więcej informacji



# Queen<sup>TM</sup>

## Inatreq<sup>TM</sup> active



## FUNGICYD

### zawiera:

- Inatreq<sup>TM</sup> active (fenpikoksamid, związek z grupy pikolinamidów)
  - 50 g/l; wg FRAC grupa 21
- protiokonazol 100 g/l; wg FRAC grupa 3



działa układowo

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 7,5 l

### Stosowanie środka:



| pszenica<br>ozima                                                                                                                                                    | pszenica<br>jara                                                  | pszenżyto<br>ozime                                                       | żyto<br>ozime                           | pszenżyto<br>jare                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowa na liściach pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów | mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowa liści pszenicy | mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści | rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta | brunatna plamistość liści, rdza brunatna |



stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69); **wyjątkiem jest zwalczanie fuzariozy kłosów w pszenicy ozimej**, w tym przypadku zalecane jest stosowanie od fazy początku kłoszenia do fazy końca kwitnienia (BBCH 51–69)



**MAX** maksymalna dawka: 1,5 l/ha



**zalecana dawka:** 1,25 l/ha\*



**ilość wody do zabiegu:** 150–300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Po zbiorze zbóż chronionych środkiem Queen<sup>TM</sup> można uprawiać wszystkie rośliny przewidziane w normalnym zmianowaniu. Ze względu jednak na możliwość wystąpienia uszkodzeń liści i zahamowania wzrostu roślin, życie trwałą można wysiewać najwcześniej po 3 tygodniach od daty wykonania zabiegu.



**okres karencji:** nie dotyczy

\* z wyjątkiem zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozy paskowanej liści w pszenicy ozimej i jarej, gdzie zalecana dawka wynosi od 1,0 l/ha

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Talius™ 200 EC

## FUNGICYD

### zawiera:

- proquinazid 200 g/l; wg FRAC grupa 13



działa powierzchniowo

Dostępne opakowania: 1 l

### Stosowanie środka:

|  | pszenica<br>ozima                                                                                                                                  | pszenica<br>jara                                                                       | pszenżyto<br>ozime                                                                                                                                         | jęczmień<br>ozimy                                                                                                                                            | jęczmień<br>jary                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mączniak prawdziwy<br>zbóż i traw, septoriozy<br>liści, septorioza plew,<br>brunatna plamistość<br>liści, fuzaryjna zgorzel<br>podstawy źdźbła     | mączniak prawdziwy<br>zbóż i traw, septoriozy<br>liści, brunatna plami-<br>stość liści | septorioza liści, sep-<br>torioza plew, brunat-<br>na plamistość liści                                                                                     | mączniak praw-<br>dziwy zbóż i traw,<br>plamistość siatkowa<br>jęczmienia, rdza<br>jęczmienia                                                                | mączniak prawdziwy<br>zbóż i traw, plamistość<br>siatkowa jęczmienia,<br>rdza jęczmienia |
|  | stosować zapobiegawczo lub po zaobserwo-<br>waniu pierwszych objawów chorób, od pełni<br>krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia<br>(BBCH 59) |                                                                                        | stosować zapo-<br>biegawczo lub po<br>zaobserwowaniu<br>pierwszych objawów<br>chorób, od pełni<br>krzewienia (BBCH 25)<br>do pełni kwitnienia<br>(BBCH 65) | stosować zapobiegawczo lub po zaobserwo-<br>waniu pierwszych objawów chorób, od pełni<br>krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania<br>w źdźbło (BBCH 39) |                                                                                          |

**MAX** maksymalna dawka: 0,25 l/ha

**zalecana dawka:** 0,15–0,25 l/ha

**ilość wody do zabiegu:** 200–400 l/ha

**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste

**liczba zabiegów w sezonie:** 2 (odstęp między zabiegami – 14 dni)

**okres karencji:** nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania






# Talius™ SAD

## FUNGICYD

### zawiera:

- proquinazid 200 g/l; wg FRAC grupa 13



działa powierzchniowo



SADOWNICZE



Dostępne opakowania: 250 ml

### Stosowanie środka:

|  | jabłoń                                                                                                                                                      | grusza                     | truskawka                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mączniak jabłoni                                                                                                                                            | mączniak jabłoni na gruszy | mączniak prawdziwy truskawki                                                                                                                                                          |
|  | stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od fazy mysiego ucha do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 10-75) |                            | stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby przed zbiorem owoców, do momentu gdy pierwsze owoce osiągną charakterystyczną barwę (BBCH 85) lub po zbiorach |



**MAX** maksymalna dawka: jabłoń, grusza – 0,3 l/ha; truskawka – 0,375 l/ha



**zalecana dawka:** jabłoń, grusza – 0,2-0,3 l/ha

(167 ml na 10 000 m<sup>2</sup> LWA – ściany listowia dla zakresu 12000-18000 m<sup>2</sup> LWA)



**ilość wody do zabiegu:** 500-750 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste (w uprawach truskawki przy użyciu belki typu "Fragaria")



**liczba zabiegów w sezonie:**

- jabłoń, grusza: 3 (odstęp między zabiegami – co najmniej 10 dni)
- truskawka: 2 (odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni)



**okres karencji:** jabłoń i grusza – 50 dni; truskawka – 3 dni

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Wirtuoz PRO™



BEST  
SELLER



Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

## FUNGICYD

### zawiera:

- protriokonazol 200 g/l, wg FRAC grupa 3
- proquinazid 50 g/l, wg FRAC grupa 13



działa powierzchniowo



działa układowo

### Stosowanie środka:

| pszenica ozima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pszenżyto ozime                                                                                                       | pszenica jara                                                                                                                                                                           | pszenżyto jare                           | jęczmień ozimy                                                                                                                                                                                    | żyto ozime                              | jęczmień jary                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| łamliwość żdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów                                                                                                                                                                                                                                                                                               | łamliwość żdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw | mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści                                                                  | rdza brunatna, brunatna plamistość liści | mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia                                                                                              | rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta | mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia |
| stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy pełni krzewienia do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% pylników jest wykształconych (BBCH 25-65), w przypadku zwalczania łamliwości żdźbła środek należy zastosować do fazy 2. kolanka (BBCH 32) w przypadku zwalczania fuzariozy kłosów środek należy zastosować od fazy początku kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% pylników jest wykształconych (BBCH 61-65) |                                                                                                                       | stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy pełni krzewienia do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% pylników jest wykształconych (BBCH 25-65) |                                          | stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy pełni krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczne pierwsze ości (BBCH 25-49) |                                         |                                                                                                      |



**MAX** maksymalna dawka: 1,0 l/ha



**zalecana dawka:** 0,75 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 150-400 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** drobnokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



**okres karencji:** 35 dni



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania

# ZORVEC™ Entecta™

## FUNGICYD

### zawiera:

- oksatiapiprolina 48 g/l; wg FRAC grupa 49
- amisulbrom 240 g/l; wg FRAC grupa 21



działa powierzchniowo



działa układowo



Dostępne opakowania: 0,25 l, 1 l, 5 l

### Stosowanie środka:

#### ziemniak



zaraza ziemniaka



stosować od fazy, gdy widoczny jest pierwszy pęd boczny (> 5 cm) (BBCH 21) do fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone, a nasiona typowej barwy (BBCH 89), pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni; krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 0,25 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 150-600 l/ha



**liczba zabiegów w sezonie:** program ochrony powyżej 10 zabiegów – 3x Zorvec; program od 6-10 zabiegów – 2x Zorvec; program 5 zabiegów i mniej – stosowanie Zorvec 1 raz w sezonie



#### Następstwo roślin:

- w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji możliwe jest sadzenie lub sianie roślin następnych po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu środkiem Zorvec™ Entecta™,
- w normalnych warunkach/normalnym cyklu wegetacji – nie dotyczy.



**okres karencji:** 7 dni

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Herbicydy

Zwalczanie nawet najbardziej uciążliwych chwastów:

- w uprawach zbóż (Bizon™, Elipris™, Lancet Plus™ 125 WG, Nomad™ 75 WG, Mustang™ 306 SE, Mustang Forte™ 195 SE, Quelex™ Complex Pak, Starane™ Forte, Rexade™ Esteron™ Pak),
- na plantacjach rzepaku (Belkar™ Kliper™ Pak, Kerb™ 400 SC, Korvetto™, LaDiva™, Lontrel™ 300 SL, Navigator™ 360 SL),
- w uprawach buraka cukrowego (Lontrel™ 300 SL, Promungu® 700 SC),
- w sałacie, cykorii, endywii, jabłoni (Kerb™ 400 SC),
- w kukurydzy (Dragster™ Pak, Mustang™ 306 SE, Principal™ Flex, Titus™ 25 WG),
- w ziemniaku i pomidorze (Titus™ 25 WG),
- na użytkach zielonych (Fernando Forte™ 300 EC),
- na trawnikach, boiskach sportowych, polach golfowych (Starane™ Trawniki).



# Belkar™ Kliper™ Pak

Arylex™ active



RZEPAK



## HERBICYD

### Pakiet herbicydów: Belkar™ i Kliper™

#### Belkar™

- halauksyfen metylu – Arylex™ active 10 g/l; wg HRAC grupa 4
- pikloram 48 g/l; wg HRAC grupa 4

#### Kliper™

- metazachlor 500 g/l; wg HRAC grupa 15
- aminopyralid 5,3 g/l; wg HRAC grupa 4
- pikloram 13,3 g/l; wg HRAC grupa 4

Dostępne opakowania:  
pakiet na 4 ha: 1 l Belkar™ + 3 l Kliper™;  
pakiet na 20 ha: 5 l Belkar™ + 15 l Kliper™



działa układowo



działa kontaktowo

### Zwalczane chwasty:

bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, jasnoty, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne

### Stosowanie środka:

#### rzepak ozimy



stosować jesienią, od 2 liści właściwych rzepaku (od BBCH 12)

Uwaga: ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: Belkar™ 0,25 l/ha + Kliper™ 0,75 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200–300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następce po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: wszystkie rośliny,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.



**okres karencji:** nie dotyczy



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



## HERBICYD

### zawiera:

- diflufenikan 100 g/l; wg HRAC grupa 12
- florasulam 3,75 g/l; wg HRAC grupa 2
- penoksulam 15 g/l; wg HRAC grupa 2



działa układowo



działa kontaktowo



ZBOŻA



Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

### Zwalczane chwasty:

chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

### Stosowanie środka:



**pszenica ozima, jęczmień ozimy,  
pszenżyto ozime, żyto ozime**

zalecany termin aplikacji: jesień, 1-4 liście zbóż  
(BBCH 11-14)



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 1,0 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następce po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: rzepak ozimy, zboża ozime, trawy, poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna inkarnatka),
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.



**okres karencji:** nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Dragster™ Pak

## HERBICYD



KUKURYDZA



### Pakiet herbicydów: Dragster™ i Diablo™ 306 SE

#### zawiera:

- rimsulfuron 148,15 g/kg; wg HRAC grupa 2
- tifensulfuron metylu 92,6 g/kg; wg HRAC grupa 2
- florasulam 6,25 g/l; wg HRAC grupa 2
- 2,4-D 2-EHE 300 g/l; wg HRAC grupa 4
- sejfner



działa układowo

Dragster™ Pak składa się z preparatów:  
Diablo™ 306 SE (1 l) i Dragster™ (0,405 kg)  
oraz adiuwanta Dassoil™

Zawsze stosować z zalecanym adiuwantem: Dassoil™

### Zwalczane chwasty:

chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne, włośnica zielona

### Stosowanie środka:

#### kukurydza



stosować wiosną, od 2 do 6 liści kukurydzy  
(BBCH 12–16)



**MAX**

**maksymalna/zalecana dawka:** Dragster™ 135 g/ha + Diablo™ 306 SE 0,33 l/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha (adiuwant)



**ilość wody do zabiegu:** 200–400 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Po zastosowaniu Dragster™ Pak wiosną i zbiorze kukurydzy można uprawiać:

- jesienią: zboża,
- wiosną kolejnego roku kalendarzowego: buraki cukrowe, groch, jęczmień jary, lucernę, pomidory, rzepak jary, słonecznik, soję, ziemniaki.



**okres karencji:** 60 dni

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Elipris™

## HERBICYD



ZBOŻA



Dostępne opakowania: 1 l, 3 l

### zawiera:

- flufenacet 240 g/l; wg HRAC grupa 15
- diflufenikan 180 g/l; wg HRAC grupa 12
- halauksyfen metylu – Arylex™ active 11,24 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo



działa kontaktowo

### Zwalczane chwasty:

**zastosowanie wczesnie powschodowe (BBCH 12-13):** chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna

### Stosowanie środka:



**pszenica ozima, jęczmień ozimy,  
pszenżyto ozime, żyto ozime**

zalecany termin aplikacji: jesień, 2-3 liście zbóż (BBCH 12-13)



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 0,4 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 150-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następce po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: wszystkie rośliny,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.



**okres karencji:** nie dotyczy



**Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania**

# Fernando Forte™ 300 EC



UŻYTKI  
ZIELONE



## HERBICYD

### zawiera:

- fluroksypyr 150 g/l; wg HRAC grupa 4
- trichlopyr 150 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo

Dostępne opakowania: 1 l

### Zwalczane chwasty:

ambrozja bylicolistna, babka lancetowata (do 8 liści), bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny

### Stosowanie środka:

#### użytki zielone



stosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów, najlepiej wiosną w początkowym okresie ich wegetacji, jeśli run została skoszona lub wypasane są na niej zwierzęta, należy odczekać 2-3 tygodnie do czasu jej odrośnięcia, nie później jednak, niż do osiągnięcia przez trawy wysokości 25 cm

 **MAX** maksymalna/zalecana dawka: 2,0 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

W przypadku konieczności przeznaczenia łąk i pastwisk, na których zastosowano środek Fernando Forte™ 300 EC pod użytkowanie rolnicze, uprawa roślin wrażliwych wymaga upewnienia się o całkowitym rozkładzie resztek chwastów. Pozostałości środka z rozkładających się tkanek chwastów mogą mieć negatywny wpływ na rośliny uprawiane następnie po użytku zielonym. Do roślin szczególnie wrażliwych należą: rośliny bobowate (motylkowate), marchew i inne rośliny uprawne z rodziny baldasz-kowatych, ziemniak, pomidor, sałata i inne rośliny uprawne z rodziny astrowatych. Nie uprawiać roślin wrażliwych jesienią tego roku, w którym zastosowano środek. Po 6 tygodniach od zabiegu można uprawiać: brukselkę, jarmuż, rzepę, trawy oraz ich mieszanki. Jeśli planuje się uprawę roślin wrażliwych, preparatu nie należy stosować później niż do końca lipca roku poprzedniego.



**okres karencji:** 7 dni



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania

# Kerb™ 400 SC

## HERBICYD



SAŁATA



CYKORIA



RZEPAK



JABŁOŃ



Dostępne opakowania: 5 l

### zawiera:

- propyzamid 400 g/l; wg HRAC grupa 3



działanie dogłębowe

### Zwalczane chwasty:

**1,875 l/ha:** gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, samosiewy pszenicy jarej, wyczyniec polny, życzica wielokwiatowa; **2,8–3,1 l/ha:** chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, szarłat szorstki; **3,1 l/ha:** bodziszek porożcinany, perz właściwy, wiechlina roczna

### Stosowanie środka:

sałata uprawiana w gruncie, endywia, cykoria liściowa głowiasta (radicchio), cykoria sałatowa uprawiana w gruncie

rzepak ozimy

jabłoń



stosować przed wschodami roślin uprawianych z siewu lub po posadzeniu roślin uprawianych z rozsady

stosować jesienią w fazie 4–5 liści rzepaku (BBCH 14–15)

stosować późną jesienią po zahamowaniu wegetacji roślin, opryskiwać pasowo w rzędach roślin



**maksymalna dawka:** sałata, endywia, cykoria liściowa głowiasta (radicchio), cykoria sałatowa uprawiana w gruncie, jabłoń: 3,1 l/ha; rzepak ozimy: 1,875 l/ha



**zalecana dawka:** sałata, endywia, cykoria liściowa głowiasta (radicchio), cykoria sałatowa uprawiana w gruncie: 2,8–3,1 l/ha; rzepak ozimy: 1,875 l/ha; jabłoń: 3,1 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** sałata, endywia, cykoria liściowa głowiasta (radicchio), cykoria sałatowa uprawiana w gruncie: 500–1 000 l/ha; rzepak ozimy, jabłoń: 100–400 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

- Kerb™ 400 SC jest herbicydem działającym dogłębowo, pobieranym przez korzenie, w związku z tym następujące okresy pomiędzy zabiegiem a siewem lub sadzeniem roślin następczych powinny być przestrzegane:
  - **rośliny odporne:** karczoch, cykoria, sałata oraz endywia mogą być uprawiane niezależnie od daty zabiegu w roślinie przedplonowej,
  - **rośliny częściowo odporne:** strączkowe, kukurydza, sorgo, marchew, ziemniak, seler oraz truskawka mogą być uprawiane po upływie 5 miesięcy od daty zabiegu w roślinie przedplonowej,
  - **rośliny częściowo wrażliwe:** burak cukrowy, szpinak, dyniowate, kapustne, rzepak, cebula, czosnek, papryka, pomidor oraz bakłażan mogą być uprawiane po upływie 8 miesięcy od daty zabiegu w roślinie przedplonowej,
  - **rośliny wrażliwe:** zboża jare i ozime oraz trawy mogą być uprawiane po upływie 12 miesięcy od daty zabiegu w roślinie przedplonowej.
- Przed siewem lub sadzeniem roślin następczych, zwłaszcza zbóż i traw, należy wykonać orkę na głębokość co najmniej 15 cm.
- Przedstawione powyżej warianty dotyczą maksymalnych okresów pomiędzy zastosowaniem środka a uprawą roślin następczych i mogą ulec skróceniu przy optymalnych warunkach glebowo-klimatycznych (duża ilość opadów, wysokie temperatury) po zabiegu lub gdy zastosowano niższe dawki herbicydu Kerb™ 400 SC.
- W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania rzepaku ozimego, na którym stosowano Kerb™ 400 SC (w wyniku wymarznienia lub uszkodzenia roślin przez choroby i szkodniki) można uprawiać ziemniaki, buraki, groch, fasolę, rzepak jary, kukurydzę i sałatę.
- W przypadku zaorania rzepaku ozimego nie uprawiać wiosną zbóż i traw.
- Zboża i trawy można uprawiać po upływie 9 miesięcy od daty zabiegu w rzepaku ozimym.



**okres karencji:** sałata, endywia, cykoria – 6 tygodni;  
rzepak ozimy, jabłoń – nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania





# Korvetto™

## Arylex™ active



RZEPAK



## HERBICYD

### zawiera:

- chlopyralid 120 g/l; wg HRAC grupa 4
- haloxyfen metylu – Arylex™ active 5 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

### Zwalczane chwasty:

bodziszek, chaber bławatek, dymnica pospolita, jasnoty, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny

### Stosowanie środka:

rzepak ozimy



stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy wydłużania pędu głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rzepaku (BBCH 30–50)



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 1,0 l/ha



ilość wody do zabiegu: 100–300 l/ha



zalecane opryskiwanie: średniokropliste



liczba zabiegów w sezonie: 1



#### Następstwo roślin:

Ze względu na możliwość wykrycia pozostałości chlopyralidu, rośliny następne należy siał nie wcześniej niż 125 dni od daty zabiegu środkiem Korvetto™ i po wymieszanu gleby na głębokość minimum 20 cm.



okres karencji: nie dotyczy



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania

# LaDiva™

## Arylex™ active

### HERBICYD

#### zawiera:

- halauksyfen metylu – Arylex™ active 10 g/l; wg HRAC grupa 4
- pikloram 48 g/l; wg HRAC grupa 4
- aminopyralid 32 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo



RZEPAK



Dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l, 5 l

#### Zwalczane chwasty:

bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity

#### Stosowanie środka:

##### rzepak ozimy



stosować jesienią, od fazy 2 liści właściwych do fazy 9 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-19)  
zalecany termin aplikacji: jesień, 2-4 liście rzepaku (BBCH 12-14)

Uwaga: ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 0,25 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 100-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następne po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: zboża, rzepak ozimy, gorczyca, trawy,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.



**okres karencji:** niewymagany



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania

# Lancet Plus™

## 125 WG



ZBOŻA



### HERBICYD

#### zawiera:

- florasulam 25 g/kg; wg HRAC grupa 2
- piroksysulam 50 g/kg; wg HRAC grupa 2
- aminopyralid 50 g/kg; wg HRAC grupa 4



działa układowo

Dostępne opakowania: 0,2 kg, 1 kg

Zawsze stosować z zalecanym adiuwantem: Dassoil™

### Zwalczane chwasty:

chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny i trójbarwny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziwnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

### Stosowanie środka:

**pszenica ozima,  
pszenżyto ozime, żyto ozime**

**Nie stosować w uprawie jęczmienia ozimego!**



stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zbóż (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu



#### maksymalna/zalecana dawka:

Lancet Plus™ 125 WG 0,2 kg/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha (adiuwant)



**ilość wody do zabiegu:** 150-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następne po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: rzepak ozimy, zboża ozime, gorczyca na poplon, kapusta z rozsady, trawy,
- wiosną następnego roku: zboża jare, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne rośliny kapustowate, trawy.




**okres karencji:** 60 dni



**Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania**

# Lontrel™ 300 SL



## HERBICYD

### zawiera:

- chlopyralid 300 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo

Dostępne opakowania: 0,25 l, 0,5 l, 1 l

### Zwalczane chwasty:

chaber bławatek, maruna nadmorska, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

### Stosowanie środka:

|  | rzepak ozimy                                                                                                                                                                                                                                                    | burak cukrowy                                  | cebula z siewu                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• stosować jesienią, w fazie 4–6 liści rzepaku (BBCH 14–16);</li><li>• stosować wiosną – w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych</li></ul> | stosować w fazie 2–4 liści buraka (BBCH 12–14) | stosować w fazie wyraźnie widocznych 3 liści (BBCH 13) |



**MAX** maksymalna dawka: 0,4 l/ha



**zalecana dawka:** 0,3–0,4 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200–300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następce po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: wszystkie rośliny,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.



**okres karencji:** nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Mustang<sup>TM</sup>

## 306 SE



ZBOŻA



KUKURYDZA



## HERBICYD

### zawiera:

- florasulam 6,25 g/l; wg HRAC grupa 2
- 2,4-D 300 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

### Zwalczane chwasty:

chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy i rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

### Stosowanie środka:

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa)

kukurydza



stosować wiosną, od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 12-32)

stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)

 **MAX** maksymalna dawka: 0,6 l/ha



**zalecana dawka:** pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa): 0,4-0,6 l/ha; kukurydza: 0,6 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** zboża: 200-300 l/ha; kukurydza: 200-400 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następce po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: wszystkie rośliny,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.




**okres karencji:** nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Mustang Forte<sup>TM</sup>

## 195 SE



## HERBICYD

### zawiera:

- 2,4-D 2-EHE w formie estru 271 g/l (co odpowiada 180 g/l 2,4-D w formie kwasu); wg HRAC grupa 4
- aminopyralid 10 g/l; wg HRAC grupa 4
- florasulam 5 g/l; wg HRAC grupa 2



działa układowo

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 15 l

## Zwalczane chwasty:

**zboża ozime:** chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne; **zboża jare:** fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne

## Stosowanie środka:

**pszenica ozima, żyto ozime,  
pszenżyto ozime**



stosować wiosną, od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32)

**jęczmień jary, pszenica jara, owies,  
mieszanka jęczmienia jarego z owsem**

stosować wiosną, od fazy 4 liści właściwych do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 14-32)



**maksymalna/zalecana dawka:** pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime: 1,0 l/ha;  
jęczmień jary, pszenica jara, owies, mieszanka jęczmienia jarego z owsem: 0,8 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 150-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następne po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: rzepak ozimy, zboża ozime, gorczyca na poplon, kapusta z rozsady, trawy,
- wiosną następnego roku: zboża jare, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne rośliny kapustowate, trawy.



**okres karencji:** 60 dni

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania





# Navigator™ 360 SL

## HERBICYD



RZEPAK



### zawiera:

- chlopyralid 240 g/l; wg HRAC grupa 4
- pikloram 80 g/l; wg HRAC grupa 4
- aminopyralid 40 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo

### Zwalczane chwasty:

chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, rdestówka powojowata, samosiewy grochu

Dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l, 5 l

### Stosowanie środka:

#### rzepak ozimy



stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie pełni rozwiniętych liści do czterech liści właściwych (BBCH 10-14) na chwasty znajdujące się w fazie liści do 4 liści właściwych



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 0,2 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 150-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następce po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: zboża, rzepak ozimy, gorczyca, trawy,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.



**okres karencji:** nie dotyczy



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania

# Nomad™

## 75 WG



### HERBICYD

#### zawiera:

- piroksysulam 75 g/kg; wg HRAC grupa 2



działa układowo

Dostępne opakowania: 0,12 kg, 0,48 kg

Zawsze stosować z zalecanym adiuwantem, np. Dassoil™

### Zwalczane chwasty:

**120 g/ha:** gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, maruna nadmorska, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity; **250 g/ha:** wyczyniec polny, życica trwała

### Stosowanie środka:

pszenica ozima, pszenżyto ozime,  
żyto ozime

Nie stosować w uprawie jęczmienia ozimego!



stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji roślin od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zbóż (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu



**MAX** maksymalna dawka: Nomad™ 75 WG 250 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha (adiuwant)



**zalecana dawka** (w zależności od gatunków zwalczanych chwastów):

- miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne: **Nomad™ 75 WG 120 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha** (adiuwant)
- wyczyniec polny i życica trwała: **Nomad™ 75 WG 250 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha** (adiuwant)



**ilość wody do zabiegu:** 150–300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następce po zbiorze plonu: jesienią tego samego roku lub wiosną kolejnego roku kalendarzowego można uprawiać: rzepak ozimy i jary, zboża, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, życice, gorczycę, słonecznik, fasolę (fasola zwykła), peluszkę, koniczynę inkarnatkę.



**okres karencji:** 60 dni

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Principal™ Flex

## HERBICYD



KUKURYDZA



### zawiera:

- dikamba 510,42 g/kg; wg HRAC grupa 4
- nikosulfuron 62,475 g/kg; według HRAC grupa 2
- rimsulfuron 31,25 g/kg; według HRAC grupa 2
- sejfner: isoxadifen 31,20 g/kg



działa układowo

Dostępne opakowania: 0,48 kg, 2,4 kg

Zawsze stosować z zalecanym adiuwantem

### Zwalczane chwasty:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, maruna nadmorska, perz właściwy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, szarłat szorstki, tobołki polne, włośnica zielona, żóltlica drobnokwiatowa, życica wielokwiatowa

### Stosowanie środka:

#### kukurydza



#### stosować:

- jednorazowo: w fazie 2–6 liści kukurydzy (BBCH 12–16);
- w dawkach dzielonych:
  1. zabieg w fazie 2–3 liści kukurydzy (BBCH 12–13),
  2. zabieg w fazie 4–6 liści kukurydzy (BBCH 14–16)

Uwaga: stosować gdy większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15–20 cm, rośliny chwastnicy jednostronnej i innych chwastów jednoliściennych znajdują się w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, a większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2–4 liści



**MAX**

#### maksymalna/zalecana dawka:

jednorazowo: 480 g/ha + adiuwant lub w dawkach dzielonych: 2 x 240 g/ha + adiuwant



**ilość wody do zabiegu:** 100–400 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1 lub 2 (odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni)



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następne po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: zboża,
- wiosną następnego roku: zboża jare, rzepak jary, ziemniaki, buraki cukrowe, słonecznik, len, soja, groch, fasola, pomidory.



**okres karencji:** niewymagany



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania

# Promungu<sup>®</sup>

## 700 SC



BURAK CUKROWY

### HERBICYD

#### zawiera:

- metamitron 700 g/l; wg HRAC grupa 5



działa układowo

Dostępne opakowania: 5 l

#### Zwalczane chwasty:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotowy, żółtlica drobnokwiatowa

#### Stosowanie środka:

##### burak cukrowy



##### zabieg dogłębowy i zabiegi nalistne

- **pierwszy zabieg** po siewie buraka, przed wschodami chwastów: Promungu<sup>®</sup> 700 SC w dawce 2,0 l/ha
- **drugi zabieg** w fazie liścienia chwastów 7-14 dni po pierwszym zabiegu: Promungu<sup>®</sup> 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
- **trzeci zabieg** 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): Promungu<sup>®</sup> 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha

##### ochrona oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych

Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka, jednak nie później niż do fazy 8 liści buraka (BBCH 18), każdorazowo na chwasty w fazie liścienia.

- **pierwszy zabieg:** Promungu<sup>®</sup> 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
- **drugi zabieg** 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty: Promungu<sup>®</sup> 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
- **trzeci zabieg** 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): Promungu<sup>®</sup> 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 1-2 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 3 (odstęp między zabiegami: 7-14 dni)



##### Następstwo roślin:

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następnie; w przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne oraz seradellę; po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki; po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ poszczególnych składników na rośliny uprawiane następnie.



**okres karencji:** nie dotyczy (dla pasz 60 dni)



Więcej informacji

# Quelex™ Complex Pak

Arylex™ active



## HERBICYD

### Pakiet herbicydów: Quelex™ i Naceto™ SC

#### zawiera:

- florasulam 100 g/kg; wg HRAC grupa 2
- haloaksofen metylu – Arylex™ active 104,2 g/kg; wg HRAC grupa 4
- diflufenikan 200 g/l; wg HRAC grupa 12
- flufenacet 400 g/l; wg HRAC grupa 15



działa układowo



działa kontaktowo

#### Zwalczane chwasty:

chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tobołki polne



Dostępne opakowania:  
pakiet na 4 ha: Quelex™ 0,1 kg + Naceto™ SC 1 l;  
pakiet na 20 ha: Quelex™ 0,5 kg + Naceto™ SC 5 l

#### Stosowanie środka:

**pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy**



stosować jesienią, od fazy 1 do 3 liści właściwych zbóż (BBCH 11-13)



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: Quelex 25 g/ha + Naceto SC 0,25 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następne po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: wszystkie rośliny,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.

W przypadku bardzo wrażliwych roślin następnych (soja, koniczyna, soczewica), wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż, zalecana jest orka przed siewem tych roślin.



**okres karencji:** nie dotyczy



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania

# Rexade™ Esteron™ Pak

Arylex™ active



ZBOŻA

## HERBICYD

### Pakiet herbicydów:

#### Rexade™ i Esteron™ 600 EC

##### zawiera:

- florasulam 100 g/kg; wg HRAC grupa 2
- haloaksyfen metylu – Arylex™ active 104,23 g/kg; wg HRAC grupa 4
- piroksysulam 240 g/kg; wg HRAC grupa 2
- 2,4-D 2-EHE w formie estru 905 g w 1 litrze środka (co odpowiada 600 g/l formy kwasu 2,4-D); wg HRAC grupa 4

Dostępne opakowania: Rexade™ Pak składa się z preparatów Rexade™ (0,05 kg lub 0,25 kg) i Esteron™ 600 EC (0,5 l lub 2,5 l)



działa układowo

### Zwalczane chwasty Rexade™ + Esteron™ lub adiuwant\*:

**zboża ozime:** chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne;

**pszenica jara:** fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, owies głuchy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

### Stosowanie środka:

**pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara**

**Nie stosować w uprawie jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego!**



stosować wiosną, od początku krzewienia do końca krzewienia zbóż (BBCH 21–29)

#### maksymalna/zalecana dawka:



**MAX**

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime: Rexade™ 50 g/ha + Esteron™ 600 EC 0,5 l/ha;  
pszenica jara: Rexade™ 40 g/ha + Esteron™ 600 EC 0,4 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200–300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następne po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: wszystkie rośliny,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.

W przypadku bardzo wrażliwych roślin następnych (soja, koniczyzna, soczewica, słonecznik) wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż, zalecana jest orka przed siewem tych roślin.



**okres karencji:** 60 dni

\* z uwagi na zawarte składniki, Esteron™ 600 EC spełnia również funkcję adiuwantu

**Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania**





# Starane<sup>TM</sup> Forte

Arylex<sup>TM</sup> active



ZBOŻA



## HERBICYD

### zawiera:

- halauksyfen metylu – Arylex<sup>TM</sup> active 12 g/l; wg HRAC grupa 4
- fluroksypyr meptylu 280 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo

Dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l

### Zwalczane chwasty:

#### zboża ozime

**0,25 l/ha:** dymnica pospolita, jasnota purpurowa; **0,375 l/ha:** bodziszek drobny, bodziszek porożcinany, przytulia czepna; **0,5 l/ha:** chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity

#### zboża jare

**0,25 l/ha:** przytulia czepna; **0,375 l/ha:** bodziszek drobny, komosa biała; **0,5 l/ha:** rdestówka powojowata

### Stosowanie środka:

**pszenica ozima i jara, pszenica twarda ozima i jara, pszenica orkiszowa ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto ozime i jare, pszenżyto ozime i jare**



stosować wiosną, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13–45)



**MAX** maksymalna dawka: 0,5 l/ha



**zalecana dawka:** 0,25–0,5 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 100–400 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



#### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następcze po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: facelia błękitna, gorczyca biała, groch, gryka zwyczajna, rzodkiew zwyczajna, rzepak ozimy, wyka siewna, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, trawy. Przed siewem lucerny, bobiku, bobu, soi i koniczyzny wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż, zalecane jest wykonanie orki.
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.



**okres karencji:** 50 dni

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



## HERBICYD

### zawiera:

- fluoksypyr 40 g/l; wg HRAC grupa 4
- chlopyralid 20 g/l; wg HRAC grupa 4
- MCPA 200 g/l; wg HRAC grupa 4



działa układowo

### Zwalczane chwasty:

babka zwyczajna, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, maruna nadmorska, mniszek pospolity, niezapominajka polna, przytulia czepna, stokrotka pospolita, szczaw tępolistny

### Stosowanie środka:

**trawniki, boiska sportowe, pola golfowe**



stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę, od wiosny do wczesnej jesieni w okresie intensywnego wzrostu chwastów

**Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, gdzie zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:**

- ludzie: 12 godzin
  - zwierzęta gospodarskie: 21 dni.
- Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września.



**MAX maksymalna dawka:** 4 l/ha (co odpowiada 40 ml środka stosowanym na 100 m<sup>2</sup>)



**zalecana dawka:** 3-4 l/ha (co odpowiada 30-40 ml środka stosowanym na 100 m<sup>2</sup>)



**ilość wody do zabiegu:** 200-300 l/ha (100 ml herbicydu Starane™ Trawniki należy wlać do 5-10 litrów wody)



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



**okres karencji:** nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Titus™ 25 WG



KUKURYDZA



ZIEMNIAK



POMIDOR

## HERBICYD

### zawiera:

- rimsulfuron 250 g/kg; wg HRAC grupa 2



działa układowo



Dostępne opakowania: 20 g, 100 g

Zawsze stosować z zalecanym adiuwantem

## Zwalczane chwasty:

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

## Stosowanie środka:

| kukurydza                               | ziemniak<br>(zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pomidor*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stosować w fazie 1-7 liści (BBCH 11-17) | <b>zabieg jednorazowy:</b> stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka<br><b>dawki dzielone:</b> pierwszy zabieg: stosować w fazie 1-7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego, drugi zabieg: stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu, gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego                                                                                                                                      | <b>zabieg jednorazowy:</b> stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1. do 8. liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści<br><b>dawki dzielone:</b> pierwszy zabieg: stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1. do 8. liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści, drugi zabieg: wykonać po upływie 7 dni od pierwszego zabiegu |
|                                         | <b>silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi</b><br><b>zabieg jednorazowy:</b> stosować, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści<br><b>dawki dzielone:</b> pierwszy zabieg: stosować, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, drugi zabieg: stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* Zastosowanie małoobszarowe



**MAX**

### maksymalna/zalecana dawka:

40-60 g/ha + adiuwant w zabiegu jednorazowym w zależności od rośliny uprawnej i 20-30 g/ha + adiuwant w dawkach dzielonych w zależności od rośliny uprawnej



**ilość wody do zabiegu:** 200-300 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1 (kukurydza); 2 (ziemniak, pomidor)



### Następstwo roślin:

Możliwe rośliny następne po zbiorze plonu:

- jesienią tego samego roku, w którym zebrano plon: wszystkie rośliny,
- wiosną następnego roku: wszystkie rośliny.



**okres karencji:** nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania





# Insektycydy

Nowatorskie sposoby skutecznej eliminacji szkodników zagrażających:

- plantacjom ziemniaka i warzyw kapustnych (Spintor™),
- cebuli, pora, pomidora, ogórka, sałaty, bakłażana, selera i owoców jagodowych (Spintor™).



# Spintor™

Qalcova™ active

## INSEKTYCYD

### zawiera:

- spinosad: spinozyn A, spinozyn D 240 g/l;  
wg IRAC grupa 5



działa włąębnie (translaminarnie)



działa powierzchniowo



działa kontaktowo



działa żółdkowo i jajobójczo

Dostępne opakowania: 0,25 l



### Stosowanie środka:

| ziemniak                                     | kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie                |                                                                                                                                                                | kalafior i brokuł uprawiany w gruncie            | cebula i por                                                                                                   | pomidor i ogórek uprawiany pod osłonami              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| larwy stonki ziemniaczanej                   | bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | wciornastek tytoniowiec                                                                                                                                        | bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica           | wciornastek tytoniowiec                                                                                        | wciornastek zachodni                                 |
| stosować na najmłodsze stadia rozwojowe larw | stosować na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic           | stosować na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń | stosować na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic | stosować, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń | stosować z chwilą pojawienia się osobników dorosłych |



**MAX**

**maksymalna dawka:** ziemniak – 0,15 l/ha; kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, cebula i por – 0,4 l/ha; pomidor i ogórek – 0,04% (2 ml środka w 5 litrach wody)



**zalecana dawka:** ziemniak – 0,1–0,15 l/ha; kapusta głowiasta biała – 0,2–0,4 l/ha (zwalczanie bielinka kapustnika i rzepnika oraz piętnówki kapustnicy), 0,3–0,4 l/ha (zwalczanie wciornastka tytoniowca); kalafior, brokuł – 0,2–0,4 l/ha; cebula, por – 0,3–0,4 l/ha; pomidor, ogórek – 0,04% (2 ml środka w 5 litrach wody)



**ilość wody do zabiegu:** ziemniak – 150–400 l/ha; kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, cebula, por – 200–600 l/ha; pomidor, ogórek – 3–20 l/100 m<sup>2</sup>



**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 3 (ziemniak, kalafior, brokuł, cebula, por), 1–3 (kapusta biała), 4 (pomidor, ogórek);

**odstęp między zabiegami:** 14 dni (ziemniak); 7–10 dni (kapusta głowiasta biała – zwalczanie bielinka kapustnika i rzepnika oraz piętnówki kapustnicy, kalafior, brokuł); 7 dni (kapusta głowiasta biała – zwalczanie wciornastka tytoniowca, cebula, por)



**okres karencji:** od 3 do 14 dni (szczegóły w etykiecie rejestracyjnej)

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania





## Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:

| borówka wysoka, agrest, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, żurawina, truskawka, malina, jeżyna | salata głowiasta, salata długolistna (salata rzymska), salata liściowa (salata kędzierzawa) uprawiane w gruncie                                                          | jarmuż uprawiany w gruncie, kalarepa uprawiana w gruncie                                                                                                                 | seler korzeniowy uprawiany w gruncie, seler naciowy uprawiany pod osłonami                                                                                                                                                                                                  | rukola uprawiana w gruncie, rozszponka uprawiana w gruncie                                                              | szczypiorek, czosnek, czosnek askalonski uprawiane w gruncie                                                                   | rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie                                                                                            | szpinak i szczaw uprawiany w gruncie                                                                                                                                      | bakłażan, papryka i pomidor uprawiane pod osłonami i w szklarni                                                                                                                            | grusza                                                                                  | omacnica prosowianka                                                                                                                | kukurydza cukrowa                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | bielinek kapustnik, pietnówka kapustnica                                                                                                                                 | bielinek kapustnik, pietnówka kapustnica                                                                                                                                 | liściolubka selerowa                                                                                                                                                                                                                                                        | miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna                                                       | wciornastki                                                                                                                    | wciornastki, miniarka ciepłolubka, psiankowianka, miniarka wielożerna, blyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek ćwikłanka | śmietka ciwikłanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, blyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek ćwikłanka | skośnik pomidorowy, wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| stosować od fazy pąków kwiatowych do końca fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 51-89)      | stosować od ośmiu liści właściwych do chwili, kiedy główki osiągną typową wielkość i twardość lub rośliny nie formujące główki osiągną typową masę liściową (BBCH 18-49) | stosować od ośmiu liści właściwych do chwili, kiedy główki osiągną typową wielkość i twardość lub rośliny nie formujące główki osiągną typową masę liściową (BBCH 18-49) | seler korzeniowy – stosować od fazy gdy korzeń osiąga 40% typowej średnicy do fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 44-49); seler naciowy – stosować od osiągnięcia 40% masy liściowej do osiągnięcia 100% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 44-49) | stosować od ośmiu liści właściwych do chwili, kiedy podstawy liści do początku powstawania pędu kwiatowego (BBCH 40-47) | stosować od ośmiu liści właściwych do chwili, kiedy rośliny uprawne osiągną typową wielkość, kształt i masę liści (BBCH 18-35) | stosować od fazy 3 do 8 liści (BBCH 13-18), zabieg wykonywać na najmlodsze stadia rozwojowe szkodnika                                                     | stosować od ośmiu liści właściwych do chwili, kiedy rośliny uprawne osiągną typową wielkość, kształt i masę liści (BBCH 18-49)                                            | stosować na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od początku fazy kwitnienia do stadium, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 61-71) | stosować po kwitnieniu drzew (>BBCH 70)                                                 | stosować od fazy rozwoju 4 liści do fazy pełnej dojrzałości ziarniaków (BBCH 14-75), wyłączając fazę kwitnienia roślin (BBCH 61-69) | od fazy rozwoju 4 liści do fazy pełnej dojrzałości ziarniaków (BBCH 14-75), wyłączając fazę kwitnienia roślin (BBCH 61-69) |
| maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                            | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                                                                                  | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                                                                                  | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                                                                                                                                                                                     | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                                 | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                                        | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                                                                   | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                                                                                   | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (odstęp między zabiegami – 10 dni)                                                                                                    | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (odstęp między zabiegami – 10 dni) | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1                                                                                | maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1                                                                       |
| zalecana ilość wody: 200-1200 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                        | zalecana ilość wody: 200-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                                               | zalecana ilość wody: 200-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                                               | zalecana ilość wody: 200-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                                                                                                                                                  | zalecana ilość wody: 200-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                              | zalecana ilość wody: 200-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                     | zalecana ilość wody: 200-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                                | zalecana ilość wody: 200-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                                                | zalecana ilość wody: 200-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                                                                 | zalecana ilość wody: 400-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                              | zalecana ilość wody: 400-600 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                          | 300-600 l/ha                                                                                                               |
| maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                 | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                       | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                       | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                                                                                                                          | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                      | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                             | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                        | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                        | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                                                                         | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej      | maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha powierzchni opryskiwanej                                                  | 0,4 l/ha                                                                                                                   |

**zalecane opryskiwanie:** średniokropliste



# Moje pole, moje zasady



## LaDiva™

Arylex™ active

**HERBICYD**

### Mój wybór to LaDiva™ – nowy, powschodowy herbicyd do ochrony rzepaku, który:

- Nie wymaga mieszanin z innymi herbicydami. Stosuję LaDiva™ SOLO!
- Błyskawicznie działa na kluczowe chwasty dwuliścienne: jasnoty, bodziszki, mak polny, chabra bławatka, przytulię czepną, chwasty rumianowate, tasznik pospolity, stulichę psią i wiele innych.
- Ma bardzo szerokie okno aplikacji, więc mogę stosować LaDivę w dogodnym dla mnie terminie od 2 do 9 liści rzepaku\*.

\* LaDiva™ najskuteczniej zwalcza chwasty wrażliwe znajdujące się w fazach od liścieni do 2-4 liści właściwych, dlatego rekomendowany termin aplikacji, to faza od 2 do 4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-14).



### Zwalczaj chwasty w rzepaku na swoich warunkach.

**e-pole™**  
PROGRAM PARTNERSKI



Więcej na **corteva.pl**

®.™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.  
©2024 Corteva.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



# Biostymulatory

Nowa grupa innowacyjnych produktów biologicznych, które wspierają producentów upraw rolniczych i ogrodniczych w sytuacji nowych regulacji prawnych i zaleceń Zielonego Ładu, a także w obliczu zmian klimatycznych:

- produkty mikrobiologiczne zawierające specjalnie wyselekcjonowane bakterie zasiedlające część nadziemną roślin, które mogą pobierać azot z atmosfery i przekształcać go w formę dostępną dla roślin (BlueN®, Utrisha™ N),
- organiczne nawozy o działaniu biostymulującym, które pomagają roślinom pobierać składniki odżywcze z gleby, a następnie wykorzystywać je w bardziej skuteczny sposób poprawiając metabolizm roślin, a tym samym zwiększając ich potencjał plonotwórczy (Kinsidro™ Grow),
- nowatorskie rozwiązania zwiększające opłacalność nawożenia oraz wykorzystania azotu (Instinct™),
- produkt biologiczny, który przyspiesza regenerację roślin po zdarzeniach stresowych i wspomaga wzrost roślin w niesprzyjających warunkach (BioForge®),
- fizjologiczny produkt wspierający fotosyntezę, przyspieszający wzrost i tworzący warunki do rozwoju nalistnej flory bakteryjnej (Cellerate MoZn),
- preparat mikrobiologiczny (Resid® MG),
- nawóz dolistny (StarterMn Platinum).





## zawiera:

- azot, potas, kobalt, molibden
- + opatentowane molekuły



do stosowania na stresy

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

## Działanie:

Wzmacnia odporność roślin w warunkach stresowych, regeneruje po silnym stresie.

## Stosowanie środka:

| kukurydza                                                                                                                                | słonecznik, soja                                                                                                                                                  | zboża ozime i jare                                                                                                                                        | rzepak ozimy                                                                                                                                              | burak cukrowy                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5 l/ha – stosowanie profilaktyczne<br>1 l/ha – zastosowanie interwencyjne po wystąpieniu stresu<br><br>dobrze miesza się z herbicydami | 0,5 l/ha – stosowanie profilaktyczne<br>1 l/ha – zastosowanie interwencyjne po wystąpieniu stresu (w fazach od początku krzewienia do końca kłoszenia BBCH 21-69) | 0,5 l/ha – stosowanie profilaktyczne<br>1 l/ha – zastosowanie interwencyjne po wystąpieniu stresu, przez cały okres wegetacji wiosennej (faza BBCH 30-74) | 0,5 l/ha – stosowanie profilaktyczne<br>1 l/ha – zastosowanie interwencyjne po wystąpieniu stresu, przez cały okres wegetacji wiosennej (faza BBCH 30-74) | 1-2 l/ha – zastosowanie w każdym przypadku stresu<br>0,5-1 l/ha – zabieg profilaktyczny co 7-15 dni, zabiegi możliwe przez cały okres wegetacji                                                     |
| ziemniak                                                                                                                                 | cebula, czosnek                                                                                                                                                   | warzywa liściaste: sałata                                                                                                                                 | pomidor, papryka                                                                                                                                          | wiśnia, czereśnia, śliwa                                                                                                                                                                            |
| 1-2 l/ha – zastosowanie w każdym przypadku stresu<br>0,5-1 l/ha – zabieg profilaktyczny co 7-15 dni                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 1-2 l/ha – jedna aplikacja na młode drzewka<br>1-2 l/ha – zastosowanie w każdym przypadku stresu<br>0,5-1 l/ha – zabieg profilaktyczny co 7-15 dni<br>1-2 l/ha – aplikacja w okresie uśpienia pąków |



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 0,5 l/ha – zapobiegawczo, 1 l/ha – interwencyjnie



liczba zabiegów w sezonie: 1-3



okres karencji: nie dotyczy



Więcej informacji

## MIKROBIOLOGICZNY

### zawiera:

- bakterie *Methylobacterium symbioticum*, szczep SB23



mikrobiologiczny



ZBOŻA



RZEPAK



KUKURYDZA



ZIEMNIAK



WARZYWA



SADOWNICZE



Dostępne opakowania: 1 kg, 3 kg

### Działanie:

BlueN® zawiera bakterie endofityczne *Methylobacterium symbioticum*, które pobierają azot atmosferyczny ( $N_2$ ) i przetwarzają go w formę dostępną dla roślin, na jony amonowe ( $NH_4^+$ ) w procesie nitrogenazy. Wspomagają fotosyntezę oraz wykorzystanie żelaza i molibdenu przez rośliny. Przez cały okres wegetacji, we wszystkich etapach wzrostu, w sposób efektywny i kontrolowany dostarczają roślinom azot, dzięki czemu przyczyniają się do intensywniejszego wzrostu i rozwoju roślin, co dalej przekłada się na wyższe plonowanie.

### Stosowanie środka:

| zboża ozime                                                                            | zboża jare                                                          | rzepak ozimy                                                                                                                        | rzepak jary                                                                        | słonecznik,<br>kukurydza,<br>sorgo, soja i inne<br>motylkowe            | burak cukrowy                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| od pełni krzewienia,<br>do początku<br>kwitnienia<br>(BBCH 25-61)                      | od pełni krzewienia<br>do fazy drugiego<br>kolanka<br>(BBCH 25-32)  | jesienią w fazie 6-8<br>liści właściwych<br>(BBCH 16-18); wiosną,<br>od fazy rozety<br>do końca pełni<br>kwitnienia (BBCH<br>30-69) | w fazie od 6-8<br>liści właściwych<br>do końca pełni<br>kwitnienia<br>(BBCH 16-69) | w fazie 4-8 liści<br>właściwych<br>(BBCH 14-18)                         | od fazy 4-8 liści do<br>zwarcia międzyrzędzi<br>(BBCH 14-39)            |
| ziemniak                                                                               | warzywa*                                                            | bakłażan, cukinia,<br>ogórek, papryka,<br>pomidor                                                                                   | truskawka                                                                          | wiśnia, czereśnia,<br>śliwa, brzoskwinia,<br>morela, jabłoń,<br>grusza  | winorośl                                                                |
| w okresie między<br>łączeniem się rzędów<br>a początkiem<br>kwitnienia<br>(BBCH 25-61) | między fazą 4. liścia<br>a początkiem<br>kwitnienia<br>(BBCH 14-61) | między fazą<br>pierwszego<br>pędu bocznego<br>a początkiem<br>kwitnienia<br>(BBCH 21-61)                                            | między fazą 5. liścia<br>a początkiem<br>kwitnienia<br>(BBCH 15-61)                | od wzrostu i rozwoju<br>pędów do początku<br>kwitnienia<br>(BBCH 31-61) | między zielonym<br>pąkiem<br>a początkiem<br>kwitnienia<br>(BBCH 51-61) |

\* burak liściowy, czosnek, karczoch, seler, brokuł, cebula biała, kapusta, kalafior, endyvia, biały szparag, zielony szparag, szpinak, groch, bób, koper, sałata, melon, por, rzodkiew, kalafior, arbus, marchew



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: uprawy rolnicze – 333 g/ha; sady, winorośl – 500 g/ha



**ilość wody do zabiegu:** uprawy rolnicze – 100-250 l/ha; uprawy ogrodnicze – 100-400 l/ha;  
sady, winorośl – 500-2000 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** grubokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



**okres karencji:** nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania





# Cellerate MoZn

## zawiera:

- fosfor, molibden, cynk
- + technologia Corteva biologicals



stymulator wzrostu



Dostępne opakowania: 1 l

## Działanie:

Cellerate MoZn to nawóz dolistny o działaniu biostymulującym, przyspieszającym wzrost roślin. Stosowanie preparatu przyczynia się do lepszego wykorzystania azotu (zwiększa pobieranie i wykorzystanie azotu podanego roślinie). Przyspiesza wzrost roślin, zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju, zwiększa produkcję energetyczną roślin.

## Stosowanie środka:

| kukurydza                                                                                             | zboża ozime i jare                                                                                           | rzepak ozimy                                                                                                                                                            | słonecznik, soja                                                                                             | burak cukrowy                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,2 l/ha (1 aplikacja)<br>– w fazie od czwartego<br>do ósmego liścia<br>(BBCH 14-18)                  | 0,2 l/ha (1 aplikacja)<br>– w fazie krzewienia<br>(BBCH 21-29)                                               | 0,5 l/ha – aplikacja solo<br>0,2 l/ha – aplikacja<br>z Utrisha™ N<br>od początku wydłużania<br>pędu głównego do fazy<br>zielonego pąka<br>(BBCH 32-49)                  | 0,5 l/ha – w fazie 4-8 liści<br>właściwych (BBCH 14-18)                                                      | 0,5 l/ha – od początku<br>rozwoju wegetatywnego<br>w fazie od pierwszego<br>liścia do zakrywania<br>międzyrzędzi<br>(BBCH 10-19)                                              |
| ziemniak                                                                                              | cebula,<br>czosnek                                                                                           | warzywa liściaste:<br>sałata                                                                                                                                            | pomidor,<br>papryka                                                                                          | wiśnia, czereśnia,<br>śliwa                                                                                                                                                   |
| 0,5 l/ha – od początku<br>rozwoju wegetatywnego<br>do fazy zakrywania<br>międzyrzędzi<br>(BBCH 10-36) | 0,5 l/ha – od początku<br>rozwoju wegetatywnego<br>do pełnego rozwoju liści<br>pędu głównego<br>(BBCH 10-40) | 0,5 l/ha – od początku<br>rozwoju wegetatywnego<br>do trzech liści właściwych<br>w sałacie (BBCH 10-13)<br>i do fazy rozwoju liści na<br>pędzie głównym<br>(BBCH 10-19) | 0,5 l/ha – od fazy<br>sadzonki przez cały<br>okres rozwoju<br>wegetatywnego (faza<br>BBCH 10-29) – 2 zabiegi | 0,5 l/ha – jedna aplikacja<br>na młode drzewka<br>0,5 l/ha – jedna aplikacja<br>w czasie pęknięcia pąków<br>(BBCH 07)<br>0,5 l/ha – jedna aplikacja<br>w czasie rozwoju liści |



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 0,2-0,5 l/ha



**ilość wody do zabiegu:** 200 l/ha



**liczba zabiegów w sezonie:** 1-3



**okres karencji:** nie dotyczy



Więcej informacji





ZBOŻA



RZEPAK



KUKURYDZA



ZIEMNIAK



BURAK



## STABILIZATOR AZOTU

### zawiera:

- nitrapirynę w postaci zawiesiny mikrokapsuł 300 g/l



stabilizuje azot

Dostępne opakowania: 10 l

## Działanie:

Instinct™ to stabilizator azotu w postaci mikrokapsuł zawierający nitrapirynę. Nitrapiryna jest jednym z najefektywniejszych inhibitorów nityfikacji, która utrzymuje azot w glebie, w przyswajalnej dla roślin formie amonowej. Stosowanie Instinct™ zmniejsza straty azotu, ograniczając jego wymywanie w głąb gleby, przemieszczanie się do wód gruntowych czy ulatnianie do atmosfery. Preparat zapewnia swobodę doboru nawozów (organicznych i mineralnych) i zwiększa elastyczność w terminach ich stosowania. Umożliwia to ograniczenie liczby wjazdów oraz częściowe obniżenie stosowania nawozów mineralnych.

## Stosowanie środka:

|                                                         | OPCJA 1<br>stosować kilka dni przed lub po wysiewie<br>granulowanych, azotowych nawozów mine-<br>ralnych w postaci np. mocznika, siarczanu<br>amonu, saletry amonowej, saletraku         | OPCJA 2<br>można stosować łącznie<br>z płynnym nawozem azotowym<br>(roztworem saletrano-moczni-<br>kowym)                           | OPCJA 3<br>można stosować na polach<br>nawożonych nawozami orga-<br>nicznymi: obornik, gnojowica,<br>pomiót kurzy, masa (pulpą)<br>pofermentacyjna z biogazowni |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kukurydza                                               | przed siewem lub po siewie, ale przed<br>wschodami kukurydzy, kilka dni przed lub po<br>wysiewie azotowych nawozów mineralnych                                                           | przed siewem lub po siewie, ale<br>przed wschodami kukurydzy                                                                        | przed siewem kukurydzy, kilka<br>dni przed lub tuż po wywiezieniu<br>na pole nawozów organicznych                                                               |
| zboża ozime<br>(pszenica, jęczmień,<br>pszenżyto, żyto) | przed lub po ruszeniu wegetacji, w termi-<br>nie stosowania startowego wiosennego<br>nawożenia azotowego, oddzielnie kilka dni<br>przed lub po wysiewie azotowych nawozów<br>mineralnych | przed lub po ruszeniu wegetacji,<br>w terminie stosowania starto-<br>wego, wiosennego nawożenia<br>azotowego                        |                                                                                                                                                                 |
| zboża jare<br>(pszenica, jęczmień,<br>pszenżyto, żyto)  | przed siewem zbóż jarych, oddzielnie kilka<br>dni przed lub po wysiewie azotowych na-<br>wozów mineralnych                                                                               | przed siewem lub po siewie zbóż<br>jarych w terminie stosowania<br>głównego nawożenia azotowego                                     |                                                                                                                                                                 |
| rzepak ozimy                                            | jesienią lub wiosną po ruszeniu wegetacji,<br>oddzielnie kilka dni przed lub po wysiewie<br>azotowych nawozów mineralnych                                                                | jesienią lub wiosną                                                                                                                 | przed siewem rzepaku, nie<br>wcześniej niż kilka dni przed<br>lub tuż po wywiezieniu na pole<br>nawozów organicznych                                            |
| rzepak jary                                             | przed siewem rzepaku jarego, oddzielnie<br>kilka dni przed lub po wysiewie azotowych<br>nawozów mineralnych                                                                              | przed siewem lub po siewie<br>rzepaku jarego w terminie sto-<br>sowania głównego nawożenia<br>azotowego, przed wschodami<br>rzepaku | przed siewem rzepaku jarego,<br>nie wcześniej niż kilka dni przed<br>lub tuż po wywiezieniu na pole<br>nawozów organicznych                                     |
| ziemniak                                                | przed sadzeniem, kilka dni przed lub po<br>wysiewie azotowych nawozów mineralnych                                                                                                        | przed sadzeniem                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| burak cukrowy                                           | przed siewem, kilka dni przed lub po wysie-<br>wie azotowych nawozów mineralnych                                                                                                         | przed siewem                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 1,7 l/ha



ilość wody do zabiegu: 100–300 l/ha



liczba zabiegów w sezonie: 1

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



# Kinsidro™ Grow

## NAWÓZ

### zawiera:

- makro- i mikroelementy, w tym:  $K_2O$ ,  $SO_3$ , B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn
- chelaty EDTA
- wysoko skoncentrowane kwasy huminowe pochodzące z sosny nordyckiej, powstające jako produkt uboczny przy wytwarzaniu papieru, z dużym udziałem kwasów fulwowych
- lignosulfoniany, naturalne związki chelatujące



ZBOŻA



RZEPAK



KUKURYDZA



SŁONECZNIK



BURAK



BOBOWATE



Dostępne opakowania: 1 kg



stymulator wzrostu

## Działanie:

Kinsidro™ Grow to granulat do sporządzania zawiesiny wodnej do stosowania dolistnego. Wysokie stężenie kwasów huminowych i duża zawartość kwasów fulwowych sprawiają, że Kinsidro™ Grow wykazuje wysoką aktywność biologiczną. Produkt charakteryzuje się stałą, sprawdzoną skutecznością przy niskich dawkach stosowania, co znacząco go odróżnia od konkurencji. Kwasy huminowe i fulwowe, wzbogacone o zestaw makro- i mikroelementów w unikalnej formulacji Kinsidro™ Grow, wpływają na aktywność roślin, zwiększają ilość chlorofilu, a tym samym poprawiają wydajność fotosyntezy, aktywują wiele enzymów i stymulują działanie niektórych hormonów. W ten sposób preparat pobudza wzrost i podziały komórkowe oraz rozwój korzeni, pędów i liści. Po zastosowaniu Kinsidro™ Grow rośliny efektywniej wykorzystują składniki pokarmowe, ich tolerancja na stres środowiskowy jest większa, a w efekcie poprawia się wielkość i jakość plonu.

## Stosowanie środka:

| kukurydza                   | zboża ozime                          | zboża jare                | słonecznik                  | rzepak ozimy                          | burak cukrowy                                            | rośliny bobowate (groch, bób, soja) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| faza 2-6 liści (BBCH 12-16) | faza 2-3 liści jesienią (BBCH 12-13) | faza krzewienia (BBCH 25) | faza 2-4 liści (BBCH 12-14) | jesienią, faza 2-4 liści (BBCH 12-14) | w terminie pierwszego lub drugiego zabiegu herbicydowego | faza 4-6 liści (BBCH 14-16)         |



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 150 g/ha



ilość wody do zabiegu: uprawy rolnicze – 150-300 l/ha



liczba zabiegów w sezonie: 1



Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania



ZBOŻA



SOJA



SŁONECZNIK



KUKURYDZA



ZIEMNIAK



Dostępne opakowania: 10 kg

## zawiera:

- grzyby *Glomus iranicum* var. *tenuihypharum* budujące mikoryzę, które wchodzi w symbiozę z rośliną, zwiększając jej potencjał produkcyjny. *Glomus iranicum* to pierwszy i jedyny gatunek grzyba mikoryzowego zgłoszony i opatentowany z zastosowaniem jako biostymulator.



mikrobiologiczny

## Działanie:

Resid<sup>®</sup> MG to biostymulator w formacji granul, który rozbudowuje system korzeniowy, uodparnia na suszę, transportuje składniki pokarmowe do rośliny z przestrzeni niedostępnych dla korzeni, przyczynia się do poprawy jakości gleby. *Glomus iranicum* var. *tenuihypharum* jako główny składnik Resid<sup>®</sup> MG tworzy symbiozę mikoryzową z rośliną uprawną. Współpraca ta oparta jest na obustronnych korzyściach. Roślina dostarcza grzybowi cukry pochodzące z fotosyntezy, grzyb natomiast dostarcza roślinie wodę i składniki odżywcze. Korzyści dla rośliny uprawnej po zastosowaniu preparatu Resid<sup>®</sup> MG:

- roślina poprzez strzępki grzyba rozbudowuje swój system korzeniowy, penetrując dalej i głębiej glebę w poszukiwaniu wody i składników pokarmowych,
- rozbudowanie systemu korzeniowego zwiększa tolerancję roślin na stres wodny, ekstremalne temperatury i zasolenie,
- większa dostępność wody i składników pokarmowych przyczynia się do zwiększenia plonowania oraz do poprawienia parametrów jakościowych.

## Stosowanie środka:

| zboża                    | kukurydza | soja | słonecznik | ziemniak                |
|--------------------------|-----------|------|------------|-------------------------|
| aplikacja w czasie siewu |           |      |            | 20-30 dni po posadzeniu |



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 10 kg/ha



liczba zabiegów w sezonie: 1



okres karencji: nie dotyczy



Więcej informacji

# StarterMn Platinum



KUKURYDZA



ZBOŻA



RZEPAK



SŁONECZNIK



SOJA



BURAK



ZIEMNIAK



WARZYWA



SADOWNICZE



## zawiera:

- siarkę, mangan, azot, cynk, molibden, bor, miedź



dolistny

Dostępne opakowania: 5 l

## Działanie:

StarterMn Platinum dostarcza kluczowe makro- i mikroelementy do prawidłowego wzrostu roślin. Składniki odżywcze zawarte w produkcie wspomagają procesy fizjologiczne roślin i mogą minimalizować różne niedobory. Stosowanie preparatu optymalizuje wchłanianie, przemieszczanie i integrację pierwiastków w komórkach roślinnych. StarterMn Platinum może być stosowany w większości upraw rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

## Stosowanie środka:

| kukurydza                                                                                                         | zboża ozime i jare                                                                                      | rzepak ozimy                                                                                                                        | słonecznik, soja                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-3 l/ha – w fazie od czwartego do dwunastego liścia (BBCH 21-36)                                                 | 2-3 l/ha – w fazie krzewienia do końca strzelania w źdźbło (BBCH 21-36)                                 | 2-3 l/ha – w fazie od początku wydłużania pędu głównego do początku kwitnienia (BBCH 32-62)                                         | 2 l/ha – w fazie 4-8 liści właściwych (BBCH 14-18)                                                           |
| burak cukrowy                                                                                                     | ziemniak                                                                                                | pomidor, papryka                                                                                                                    | wiśnia, czereśnia, śliwa                                                                                     |
| 2-3 l/ha – na początku rozwoju wegetatywnego w fazie od pierwszego liścia do zakrywania międzyrzędzi (BBCH 10-19) | 2-3 l/ha – na początku rozwoju wegetatywnego (1 aplikacja) do fazy zakrywania międzyrzędzi (BBCH 10-36) | 2-3 l/ha – na początku rozwoju wegetatywnego do fazy pojawienia się zawiązków owoców (każda aplikacja co 15 dni) w fazie BBCH 21-69 | 2-3 l/ha – jedna aplikacja na młode drzewka<br>2-3 l/ha – jedna aplikacja w czasie pęknięcia pąków (BBCH 07) |



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: 2-3 l/ha



liczba zabiegów w sezonie: 1-3



okres karencji: nie dotyczy



Więcej informacji

# Utrisha™ N

## MIKROBIOLOGICZNY

### zawiera:

- bakterie *Methylobacterium symbioticum*, szczep SB23



mikrobiologiczny



ZBOŻA



RZEPAK



KUKURYDZA



ZIEMNIAK



WARZYWA



SADOWNICZE



Dostępne opakowania: 1 kg, 3 kg

## Działanie:

Utrisha™ N zawiera bakterie endofityczne *Methylobacterium symbioticum*, które pobierają azot atmosferyczny ( $N_2$ ) i przetwarzają go w formę dostępną dla roślin, na jony amonowe ( $NH_4^+$ ) w procesie nitrogenazy. Wspomagają fotosyntezę oraz wykorzystanie żelaza i molibdenu przez rośliny. Przez cały okres wegetacji, we wszystkich etapach wzrostu, w sposób efektywny i kontrolowany dostarczają roślinom azot, dzięki czemu przyczyniają się do intensywniejszego wzrostu i rozwoju roślin, co dalej przekłada się na wyższe plonowanie.

## Stosowanie środka:

| zboża              | rzepak                                                          | kukurydza          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| w fazie BBCH 25-39 | przed kwitnieniem (BBCH 30-57) i na koniec kwitnienia (BBCH 69) | w fazie BBCH 14-18 |



**MAX** maksymalna/zalecana dawka: uprawy rolnicze – 333 g/ha; sady, winorośl – 500 g/ha



**ilość wody do zabiegu:** uprawy rolnicze – 100-250 l/ha; uprawy ogrodnicze – 100-400 l/ha; sady, winorośl – 500-2000 l/ha



**zalecane opryskiwanie:** grubokropliste



**liczba zabiegów w sezonie:** 1



**okres karencji:** nie dotyczy

Zeskanuj kod  
i sprawdź zalecenia stosowania









## Doradcy ds. środków ochrony roślin

**I** Krzysztof Elerowski  
tel.: 604 416 044

**II** Paweł Krzemień  
tel.: 663 925 626

**III** Jacek Słowakiewicz  
tel.: 604 505 120

**IV** Cezary Janyszko  
tel.: 532 726 888

**V** Rafał Chorąży  
tel.: 696 866 846

**VI** Marian Kraśner  
tel.: 532 460 025

**VII** Tomasz Kopiec  
tel.: 532 726 889

**VIII** Piotr Blicharski  
tel.: 609 326 878

**IX** Jacek Bartoszewski  
tel.: 883 375 333

**X** Andrzej Skalski  
tel.: 609 183 151

**Przedstawiciel ds. produktów  
sądowniczych**  
**Łukasz Wrzosek**  
tel.: 538 946 955

