

**SKUTECZNY,
ŻE MSZYCA NIE SIADA!**




Closer[™]
INSEKTYCYD
ISOCLAST[™] ACTIVE



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World



Odkrycie i rozwój ISOCLASTTM ACTIVE to punkt w zwrotny w walce ze szkodnikami ssącymi. Jest to odpowiedź na potrzeby rolników, z zachowaniem troski o zdrowie człowieka i bezpieczeństwo środowiska. ISOCLASTTM oferuje nowoczesne rozwiązania dla produkcji rolnej w krajach całego świata.



Przełomowy produkt w walce z mszycą

Nowa grupa chemiczna

ISOCLASTTM należy do klasy chemicznej **sulfoksyminów**, co stanowi nowy wymiar w dziedzinie ochrony upraw rolnych. To pierwsza substancja owadobójcza w tej klasie i obecnie jedyny jej reprezentant. ISOCLASTTM nie jest neonicotynoidem, dzięki czemu zwalcza szkodniki odporne na substancje z tej grupy.

Przemieszczanie w roślinie

CLOSERTM przemieszcza się w roślinie na dwa sposoby:

translaminarne

– przenika z powierzchni liścia do jego wnętrza, chroniąc go w całości (nie tylko po stronie opryskanej), co pomaga dotrzeć do szkodników ukrytych w obrębie pokroju rośliny

systemicznie

– do nowych przyrostów przemieszcza się przez ksylem, dzięki czemu chroni najmłodsze części rośliny, które nie były opryskane

Dzięki tym dwóm sposobom przemieszczania, CLOSERTM umożliwia zwalczanie szkodników będących poza opryskiwaną powierzchnią.

CLOSER™ – NIEZAWODNE NARZĘDZIE W WALCE Z MSZYCĄ


Szybkie i długie działanie

CLOSER™ zapewnia doskonałą skuteczność. Pierwsze objawy działania u szkodników, są już widoczne w ciągu kilku minut po aplikacji. **Wysoka skuteczność działania utrzymuje się nawet do 14 dni po zabiegu.**



Prawie natychmiast po zabiegu, mszyca już nie żeruje

Skuteczność zwalczania mszycy kapuścianej



Zalecenia stosowania



maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania

termin stosowania

zalecana ilość wody

okres karencji

**kapusta głowiasta
brokuł, brukselka,
kalafior, sałata, szpinak**

ziemniak

0,2 l / ha	0,2 l / ha
Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49) Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.	Środek stosować od fazy tworzenia bocznych odgałęzień do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 20-59) i/lub od fazy widocznych pierwszych jagód (BBCH 70) Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc
200 – 1000 l / ha	200 – 600 l / ha
7 dni	7 dni



- ✓ **nowa substancja aktywna ISOCLAST™ ACTIVE o unikalnym mechanizmie działania**
- ✓ **zwalczanie szkodników odpornych na inne grupy chemiczne**
- ✓ **szybkie działanie z doskonałym „knock down”**
- ✓ **długi okres działania do 14 dni nawet w miejscach gdzie roślina nie została opryskana**
- ✓ **minimalny wpływ na pożyteczne owady**
- ✓ **doskonale dopasowany, do programów integrowanej produkcji**

Ochrona zdrowia pszczół

Troska o zdrowie pszczół jest niezwykle istotna dla zrównoważonego rolnictwa. CLOSER™ posiada wiele atrybutów, dzięki którym jego negatywny wpływ na pszczoły i inne pożyteczne owady jest minimalny:

- ⬡ **szybko rozkłada się do metabolitów nieszkodzących pszczołom**
- ⬡ **po wyschnięciu na liściu nie jest toksyczny dla pszczół**
- ⬡ **stosowany zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie minimalnie oddziałuje na owady pożyteczne**
- ⬡ **nie stwierdzono szkodliwości dla rodzin pszczelich po żywieniu ich pyłkiem z roślin traktowanych środkiem CLOSER™**



Edycja: rok 2018

®™ znak towarowy firmy The Dow Chemical Company lub spółki stowarzyszonej z DOW

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

APLIKACJA MOBILNA



Dow AgroSciences

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.

Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

tel. 22 548 73 00
fax 22 548 73 09
fwrpols@dow.com
dowagro.pl