



Dow AgroSciences

GoalTM

NOWA FORMULACJA - DWUKROTNIE NIŻSZA DAWKA!



Solutions for the Growing World

GOAL 480 SC - NOWA FORMULACJA, TO SAMO DZIAŁANIE NA CHWASTY!

GOAL 480 SC jest preparatem chwastobójczym przeznaczonym do zwalczania chwastów (głównie dwuliściennych) w cebuli i warzywach kapustnych (kalafior, kapusta biała, czerwona, włoska).



CEBULA



KAPUSTA BIAŁA



KAPUSTA CZERWONA



KAPUSTA WŁOSKA




KALAFIOR

GOAL 480 SC jest środkiem kontaktowym o działaniu dogłębowym i nalistnym. Tworzy warstewkę na powierzchni gleby, dzięki czemu kiełkujące chwasty zamierają stykając się z preparatem. Po wykonaniu zabiegów uprawowych (wzruszenie gleby) zanika działanie dogłębowe preparatu **GOAL 480 SC**. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów powoduje również ich zamieranie.

GOAL 480 SC stosowany nalistnie najskuteczniej zwalcza chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści (do 5-7 cm wysokości).

Działanie na chwasty



GOAL 480 SC - SPEKTRUM DZIAŁANIA

CHWASTY	GOAL 480 SC	LONTREL™ 300 SL
Chaber bławatek		+++
Fiołek polny	+++	
Gorczyca polna	+++	
Jasnota różowa	+++	
Komosa biała	+++	
Maruna bezwonna		+++
Ostrożeń polny		+++
Pokrzywa żegawka	+++	
Przetaczniki	+++	
Przytulia czepna	+++	
Psianka czarna		+++
Rdesty	+++	+++
Rumian polny		+++
Rumianek pospolity		+++
Szarłat szorstki	+++	
Tasznik pospolity	+++	
Tobołki polne	+++	
Żółtlica drobnokwiatowa	++	+++

+++ chwasty wrażliwe ++ chwasty średnio wrażliwe



GORCZYCA POLNA



KOMOSA BIAŁA



JASNOTA RÓŻOWA



PRZETACZNIKI



PRZYTULIA CZEPNA



RDEST POWOJOWY

GOAL 480 SC - ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

- cebula z siewu

Środek można stosować:

- 1
- w dawkach dzielonych, **nowa możliwość!**

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów, a szczególnie ostrożnia polnego **GOAL 480 SC** można stosować łącznie ze środkiem LONTREL 300 SL w dawce:

- I zabieg – **GOAL 480 SC** 0,05 l/ha + LONTREL 300 SL 0,10 l/ha
- II zabieg – **GOAL 480 SC** 0,05 l/ha + LONTREL 300 SL 0,15 l/ha
- III zabieg – **GOAL 480 SC** 0,05 l/ha + LONTREL 300 SL 0,15 l/ha

- I zabieg w fazie 1-2 liści cebuli,
- II zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu,
- III zabieg w 7-10 dni po drugim zabiegu.


- 2
- w dawkach dzielonych:

GOAL 480 SC trzykrotnie, w dawce 0,05 l/ha

- I zabieg w fazie 1-2 liści cebuli,
- II zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu,
- III zabieg w 7-10 dni po drugim zabiegu.



Zastosowanie GOAL 480 SC w dawkach dzielonych



- 3 dwukrotnie, pierwszy zabieg w fazie 2 liści cebuli w dawce 0,1 l/ha, zabieg powtórzyć po 10 dniach stosując dawkę 0,15 l/ha
- 4 jednorazowo od fazy 3-4 liści cebuli, zalecana dawka 0,25 l/ha
- 5 w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji środek stosować od fazy 3 liści cebuli w dawce 0,25 l/ha i po dwóch tygodniach wykonać drugi zabieg stosując dawkę 0,25 l/ha.

UWAGA

Środek w dawkach dzielonych (0,05-0,15 l/ha) stosować tylko na chwasty w fazie liścienia do fazy 1 pary liści, najlepiej uzupełniając po innych herbicydach zastosowanych wcześniej.

W celu zwiększenia skuteczności chwastobójczej, szczególnie w niesprzyjających warunkach pogodowych, można zastosować trzykrotnie w technologii dawek dzielonych, mieszaninę zbiornikową; pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści cebuli, drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, trzeci zabieg w 7-10 dni po drugim zabiegu:

GOAL 480 SC - 0,05 l/ha + Olbras* 88 EC - 1 l/ha, lub

GOAL 480 SC - 0,05 l/ha + Silvet L-77 840 AL w stężeniu 0,1% (100 ml/100 l wody)**

- cebula z dymki

- zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.
- Opryskiwać do 5 dni po posadzeniu dymki.

- kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior

- zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.
- Opryskiwać pole przygotowane do sadzenia bezpośrednio przed sadzeniem rozsady.
- Nie mieszać środka z glebą.



UWAGA

Wyższą dawkę środka stosować na glebach ciężkich i na chwasty znajdujące się w późniejszej fazie rozwojowej.

Edycja: styczeń 2014

®™ znak towarowy firmy The Dow Chemical Company ("Dow") lub spółki stowarzyszonej z Dow
* formuła o zastrzeżonej nazwie - producent PHPU Obrol
** zastrzeżona nazwa Chemtura Europe Limited

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

APLIKACJA MOBILNA



Dow AgroSciences

Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa
tel. 22 854 03 20, fax 22 854 03 29
e-mail: fwrpols@dow.com
internet: www.dowagro.pl

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.