

Fontelis[®] 200 SC

FUNGICYD

**Kompletna ochrona
bez mieszania**



* Na podstawie własnych badań pozostałości i obliczeń szacujemy, że pozostałości Fontelis 200 SC, po zastosowaniu dawki 0,75 l/ha, mogą spaść poniżej 0,01 mg/kg po 55 dniach po aplikacji.

Czym jest Fontelis® 200 SC?

To nowoczesny środek grzybobójczy. Jego substancją czynną jest pentiopirad (związek z grupy karboksamidów), o wyjątkowych właściwościach rozprzestrzeniania się na powierzchni i wewnątrz tkanek roślinnych. W roślinach wykazuje działanie kontaktowe, wgłębne i lokalnie systemiczne. **Fontelis® 200 SC** jest zarejestrowany do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby, nie później niż 48 godzin po infekcji oraz nie częściej niż 3 razy w sezonie) w zwalczaniu parcha jabłoni, mączniaka prawdziwego jabłoni oraz szarej pleśni.

Fontelis® 200 SC znajduje też zastosowanie w ochronie przed szarą pleśnią. Zabieg należy wykonać dwukrotnie: od fazy pełni kwitnienia do fazy opadania płatków kwiatowych, zwłaszcza podczas deszczowej pogody, oraz przed zbiorem (nie później niż 21 dni przed zbiorem).

Zalecenia stosowania

Jabłonie:

parch i mączniak prawdziwy, dawka: 0,5-0,75 l/ha, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego, **szara pleśń**, dawka: 0,5-0,75 l/ha.

Zabieg należy wykonać dwukrotnie: od fazy pełni kwitnienia do fazy opadania płatków kwiatowych, zwłaszcza podczas deszczowej pogody, oraz przed zbiorem (nie później niż 21 dni przed zbiorem).

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.




OCHRONA PRZED

• parchem jabłoni

• mączniakiem jabłoni

• szarą pleśnią



Każdy rodzaj piękna wymaga szczególnej opieki



Fontelis® 200 SC

- Odporny na zmywanie do 60 mm deszczu w godzinę po zabiegu
- W praktyce temperatura nie ogranicza terminu stosowania
- Skutecznie zapobiega rozwojowi choroby**
- Stosowanie produktu „solo” od dawki 0,5 l/ha
- Pierwszy preparat **z grupy SDHI** zarejestrowany łącznie do zwalczania parcha jabłoni, mączniaka jabłoni oraz szarej pleśni

** produkt należy stosować zapobiegawczo lub we wczesnych stadiach rozwoju choroby (maksymalnie 48 godzin po infekcji).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.