

Navigator™ 360 SL

HERBICYD

Perenal™ 104 EC

HERBICYD

**Niezawodni
zawodowcy**

WANTED

Navigator™ 360 SL

HERBICYD

Perenal™ 104 EC

HERBICYD

100 000

NAVIGATOR™ 360 SL

Spełnia oczekiwania i potrzeby rolników w różnych warunkach ostatnich sezonów wegetacyjnych. To efekt aminopyralidu i jego współdziałania z innymi substancjami aktywnymi zawartymi w produkcie.

Podstawa do mieszanin i zabiegów sekwencyjnych.

Temperatura:

Ważne jest, aby przed zabiegiem powschodziły chwasty, a temperatura średniodobowa była wyższa niż 8°C oraz temperatura minimalna była wyższa niż 5°C przez 6 kolejnych dni po zabiegu.

Navigator™ 360 SL wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zabiegu. Opady deszczu po tym okresie nie mają negatywnego wpływu na działanie środka.

Zwalczane chwasty:

Główne chwasty zwalczane przez mieszaninę zbiornikową Navigator™ 360 SL 0,2 l/ha z herbicydem zawierającym metazachlor 500 SC w dawce 1,25-1,5 l/ha: chaber bławatek, chwasty rumianowate, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna i inne. Chwasty w fazie do 2 liści właściwych.

Kluczowe chwasty dwuliścienne w rzepaku:



chwasty rumianowate



przytulia czepna



chaber bławatek




fiołek polny



mak polny

Możliwości stosowania:



Zalecane dawki:



Navigator™ 360 SL

HERBICYD

0,2 l/ha

Rzepak ozimy: **0,2 l/ha**.
Opryskiwać jesienią w fazie od pełni rozwiniętych liści do fazy 4 liści rzepaku (BBCH 10–14).

Mieszaniny* do zwalczania chwastów dwuliściennych:

Najlepsze, sprawdzone w praktyce rolniczej rozwiązanie to: Navigator™ 360 SL 0,2 l/ha + produkt zawierający metazachlor 500 SC, np. Metazanex** 500 SC 1,25 – 1,5 l/ha

Ekonomiczna sekwencja zabiegów to: zabieg posiewny herbicydem zawierającym chlomazon w formułacji 480 EC i następnie Navigator™ 360 SL 0,2 l/ha powschodowo.

Mieszanina oraz sekwencja zapewniają oczekiwaną przez rolników wysoką skuteczność i długotrwały efekt chwastobójczy. W trakcie aplikacji powschodowych chwasty powinny znajdować się w fazie do 2 liści właściwych.

PERENAL™ 104 EC I MIESZANINY Z PREPARATEM NAVIGATOR™ 360 SL

Legenda powróciła! Perenal™ 104 EC, uznany graminicyd, dopełnia herbicydową ochronę rzepaku ozimego zwalczając samosiewy zbóż i inne chwasty jednoliścienne.



Perenal™ 104 EC jest jedynym graminicydem posiadającym rejestrację do stosowania jesienią niezależnie od faz rozwojowych rzepaku.

Temperatura:

Środek działa najskuteczniej w temperaturach od 8 do 27°C. Perenal™ 104 EC wnika do chwastów w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie obniżają jego skuteczności. Jest to najlepiej działający graminicyd w zmiennych warunkach pogodowych jesienią.

Zwalczane chwasty:

Maksymalna dawka 0,5 l/ha: chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny. Stosować jesienią po wschodach roślin uprawnych i chwastów, **niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku ozimego.**





Technologie do zwalczania samosiewów zbóż i chwastów dwuliściennych:

Perenal™ 104 EC + Navigator™ 360 SL.

Mieszanina zbiornikowa sprawdzona w warunkach polowych (doświadczeniach) oraz rekomendowana przez Corteva Agriscience™. Doskonale sprawdza się na plantacjach, gdzie rzepak wschodzi nierównomiernie.

Mieszaniny zbiornikowe* w technologiach ochrony rzepaku, przy uproszczonej uprawie gleby albo orce:

- zabiegi sekwencyjne

I zabieg: herbicyd doglebowy

II zabieg: Navigator™ 360 SL

+ Perenal™ 104 EC

- jednorazowy zabieg powschodowy

I zabieg: Navigator™ 360 SL

+ produkt zawierający metazachlor 500 SC

+ Perenal™ 104 EC

- zwalczanie chwastów dwuliściennych

I zabieg: Navigator™ 360 SL

+ produkt zawierający metazachlor 500 SC

- zwalczanie samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych

I zabieg: Perenal™ 104 EC

W celu uzyskania informacji należy zapoznać się ze szczegółowym opisem na etykiecie – instrukcji stosowania lub skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem Corteva Agriscience™.

* Uwaga! Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych przestrzegaj zaleceń z etykiety produktów wchodzących w skład mieszaniny.

** Zastrzeżona nazwa Adama Polska.



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.